

RESECCION TRANSURETRAL DE LA PROSTATA RTUP.

La cirugía Resección Transuretral de la próstata, consiste en extraer, el tejido de la próstata, que obstruye la uretra, y por lo tanto dificulta la salida de la orina, pretendiendo con esto, mejorar la calidad de vida del paciente, al mejorar los síntomas que esto puede acarrear.

Hay varias cosas que es muy importante tener en cuenta, al tomar la decisión de operarse:

La Próstata NO SE EXTRAE EN SU TOTALIDAD. Se extrae el tejido que obstruye, queda la cápsula de la próstata. A partir de la cápsula, la glándula puede volver a crecer, presentándose nuevamente síntomas, pudiendo requerir, con el paso del tiempo, una nueva intervención.

Usted puede desarrollar Cáncer de próstata, así se haya sometido a una resección Transuretral. En el tejido remanente puede desarrollarse cáncer. Por esto no debe operarse, pensando en evitar a futuro la posibilidad de evitar un cáncer.

La cirugía, No afecta la calidad de las erecciones. Estas van a ser iguales a como estaban el día antes de la cirugía. Ni mejor ni peor.

No saldrá semen después de la cirugía. En el momento del orgasmo, el semen irá a la vejiga, y saldrá con la micción.

Existe riesgo de incontinencia urinaria temporal, y/o PERMANENTE, luego de la cirugía.

No es posible Garantizar un resultado 100% satisfactorio con su cirugía. El acto quirúrgico es un acto de medio, no de resultado. Eso sí le garantizamos 100%, de nuestra responsabilidad y compromiso, de hacer las cosas con profesionalismo, ética y dedicación.

CUIDADOS DESPUES DE LA CIRUGIA

Si Usted valora su vida, no se ponga a hacer gracias después de operado. Dele a su salud, la importancia y cuidados que se merecen.

Es normal, que los primeros días se presente sangrado al orinar (hematuria). Esto debe ir disminuyendo progresivamente.

Debe tomar una vaso grande de agua, cada hora, para mantener la orina clara.

Es usual que en el post operatorio se presente deseo urgente de ir a orinar, a veces con escape de orina. Esto irá pasando a medida que desinflama.

Debe tener reposo estricto en casa, durante los primeros 15 días.

No debe realizar NINGUNA actividad que implique hacer fuerza.

No debe Conducir vehículos automotores, motocicletas, bicicleta, cabalgar, etc.

No debe tener ningún tipo de actividad sexual, hasta que se le indique.

No debe ingerir bebidas alcohólicas durante 3 meses.

En caso de estreñimiento, Utilizar Leche de Magnesio, 2 cucharadas en las noches.

EN CASO DE PRESENTAR SANGRADO IMPORTANTE, FIEBRE, ESCALOFRÍOS. CONSULTAR POR URGENCIAS DE INMEDIATO.