

FORMULA MEDICA POST OPERATORIA CIRCUNCISION.

1. DOLEX ACTIVEGEL CAPSULAS X 500 MG No 20. TOMAR UNA CADA 6 HORAS.
2. APRONAX 550 MG TABLETAS No 10. TOMAR UNA CADA 12 HORAS.
3. CEFALEXINA 500 MG CAPSULAS No 20. TOMAR UNA CADA 6 HORAS.
4. CREMA DESITIN CREAMY O CREMA No 4 MEDICADA, 2 VECES AL DIA EN LA HERIDA,



INDICACIONES POST OPERATORIAS CIRCUNCISION

LA MAS IMPORTANTE: NO EXISTEN LAS CIRUGIAS SIN RIESGOS NI COMPLICACIONES. DELE A SU CIRUGIA TODA LA IMPORTANCIA QUE SU PROPIA VIDA LE MERECE

LAVAR LA HERIDA, 2 VECES AL DIA CON AGUA Y JABON. NO RETIRE LA SECRECION AMARILLA (FIBRINA) NI LAS COSTRAS.

APLICAR, DESITIN CREAMY O CREMA No 4 MEDICADA 2 VECES AL DIA EN LA HERIDA, NO APLIQUE ISODINE, NI NINGUN OTRO PRODUCTO SIMILAR, A MENOS QUE SE LE INDIQUE QUE DEBE HACERLO.

MANTENGA EN PENE EN POSICION HACIA ARRIBA. ESTO DISMINUIRA IMPORTANTEMENTE LA INFLAMACION.

APLIQUE HIELO, (NO DIRECTO SINO CUBIERTO POR TELA DE ALGODON) EN EL PENE, POR PERIODOS DE 20 MINUTOS CADA 2 A 3 HORAS.

LOS PUNTOS IRAN CAYENDO SOLOS, USUALMENTE EN LA SEGUNDA SEMANA DE OPERADO. NO INTENTE RETIRARLOS.

AL CAER LOS PUNTOS, ES NORMAL QUE SE NOTE CIERTA SEPARACION EN LOS BORDES DE LA HERIDA, Y LA APARICION DE UNA MUCOSIDAD DE COLOR AMARILLO. ESTO SE LLAMA FIBRINA, NO DEBE RETIRARLA, PUES FORMA PARTE DE LA CICATRIZACION NORMAL DE LA HERIDA.

NO DEBE TENER NINGUN TIPO DE ACTIVIDAD FISICA Y/O SEXUAL HASTA QUE ASI LE SEA INDICADO.

DEBE PROGRAMAR UN CONTROL POST OPERATORIO. PUEDE HACERLO AL TEL: 310 2640482 - 316 4568876 - 6614400 EXT 1129

EN CASO DE NOTAR ALGUNA ANORMALIDAD, FAVOR COMUNICARSE AL CONSULTORIO, TEL: 310 2640482 PARA QUE PROGRAME UN CONTROL EXTRA, O DIRIJASE A LA CONSULTA PRIORITARIA DE LA CLINICA META, TORRE M 3 PISO.