



INDICACIONES POST OPERATORIAS RTUP

FORMULA POST OPERATORIA.

1. CIPROFLOXACINA 500 MG TABLETAS NO 14. TOMAR UNA CADA 12 HORAS
2. DOLEX ACTIVEGEL 500 MG CAPSULAS No 20. TOMAR UNA CADA 6 HORAS
3. LECHE DE MAGNESIA PHILLIPS. TOMAR UNA O DOS CUCHARADAS EN LA NOCHE. SEGUN NECESIDAD.

CUIDADOS DESPUES DE LA CIRUGIA

Es normal, que los primeros días se presente sangrado al orinar (hematuria). Esto debe ir disminuyendo progresivamente.

Debe tomar una vaso grande de agua, cada hora, para mantener la orina clara.

Es usual que en el post operatorio se presente deseo urgente de ir a orinar, a veces con escape de orina. Esto irá pasando a medida que desinflama.

Debe tener reposo estricto en casa, durante los primeros 15 días.

No debe realizar NINGUNA actividad que implique hacer fuerza.

No debe Conducir vehículos automotores, motocicletas, bicicleta, cabalgar, etc.

No debe tener ningún tipo de actividad sexual, hasta que se le indique.

No debe ingerir bebidas alcohólicas durante 3 meses.

EN CASO DE PRESENTAR SANGRADO IMPORTANTE, FIEBRE, ESCALOFRIOS. CONSULTAR POR URGENCIAS DE INMEDIATO.