

FORMULA MEDICA POST OPERATORIO URETEROLITOTOMIA ENDOSCOPICA.

WINADEINE 325/8 mg TABLETAS No 10. TOMAR UNA CADA 8 HORAS.

SERTAL COMPUESTO 125/10 mg TABLETAS No. 20. TOMAR UNA CADA 6 HORAS.

CIPROFLOXACINA 500 mg TABLETAS No. 14. TOMAR UNA CADA 12 HORAS.

VOLTAREN 75 MG AMPOLLA. No. 02. APLICAR UNA AMPOLLA INTRAMUSCULAR CADA 12 HRS, EN CASO DE DOLOR FUERTE.

LECHE DE MAGNESIA PHILLIPS. TOMAR UNA O DOS CUCHARADAS EN LA NOCHE

INDICACIONES POST OPERATORIO URETEROLITOTOMIA ENDOSCOPICA

DEBE TOMAR LOS MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR Y EL ANTIBIOTICO, TAL CUAL COMO LE FUE INDICADO. NO DEBE EXCEDER LA DOSIS.

EN CASO DE QUE EL DOLOR SEA INTENSO, UTILICE LA INYECCION DE RESCATE (VOLTAREN, 75 MG INTRAMUSCULAR CADA 12 HORAS).

EN CASO DE QUE EL DOLOR NO SE CONTROLE A PESAR DE LOS ANALGÉSICOS, Ó FIEBRE (T= 38 GRADOS) CONSULTE DE INMEDIATO A URGENCIAS DE LA CLINICA META.

ES NORMAL LA PRESENCIA DE SANGRE EN ORINA, DURANTE UNOS DIAS.

TAMBIEN ES USUAL QUE SE EXPULSEN ALGUNOS FRAGMENTOS MUY PEQUEÑOS DE CALCULO.

INGIERA LÍQUIDOS EN UNA CANTIDAD SUPERIOR A LO ACOSTUMBRADO. (3 LITROS DIARIOS)

SI LE FUE DEJADO CATETER URETERAL, ES NORMAL QUE SIENTA UNA MOLESTIA PERMANENTE, PRICIPALMENTE AL TERMONAR LA MICCION.

EVITE REALIZAR EJERCICIO FÍSICO, CONDUCIR Ó TENER RELACIONES SEXUALES HASTA QUE ASI LE SEA INDICADO.

EN LA PRIMER SEMANA DEL POST OPERATORIO, EVITE COMIDAS ABUNDANTES O QUE LE CAIGAN PESADO.

FAVOR PROGRAMAR CITA DE CONTROL POST OPERATORIO, EN LOS TELEFONOS DEL CONSULTORIO: 310 2640482, 316 4568876, 6614400 EXT 1129

EN CASO DE NOTAR ALGUNA ANORMALIDAD, NO DUDE EN CONTACTARNOS, CELULAR: 310 2640482 - 316 4568876, 6614400 EXT 1129, O ACUDIR DE INMEDIATO A URGENCIAS DE LA CLINICA META.