



Preparación Y Recomendaciones Para Biopsia De Próstata Vía Transrectal Guiada Por Ecografía

Preparación y recomendaciones para biopsia de próstata vía transrectal guiada por ecografía.

El examen consiste en la toma de muestras de la glándula prostática empleando una aguja la cual permite realizar un corte para obtener el tejido. Las imágenes de la ecografía guían la toma de las muestras. Para esto se emplea un transductor transrectal (Aparato que produce ondas de sonido que rebotan en los tejidos del cuerpo y forman ecos).

Lea cuidadosamente y siga estas recomendaciones como preparación para el examen. Requerimientos para la realización del estudio (el no cumplimiento de la preparación impedirá la realización del examen):

- **DOS DIAS ANTES DE LA BIOPSIA:** Inicie **Ciprofloxacina tabletas de 500mg** cada 12 horas y continúelas hasta acabarlas 7 días en total, cantidad total 14 tabletas.
- **UN DIA ANTES DE LA BIOPSIA:**
 - Tomar abundante líquido y no consumir lácteos ni gaseosas.
 - Consumir dieta líquida como sopa de pastas o arroz.
 - Tomar la Ciprofloxacina tableta de 500mg a las 7 am y 7 pm; continuar cada 12 horas hasta completar 14 tabletas.
 - Tomar medio frasco de Citromel a las 2:00pm y el otro medio frasco a las 6:00pm.
- **EL DIA DE LA BIOPSIA:**
 - Entre las 05:00 y 06:00am (si la cita es en horas de la mañana) o entre las 11:00 am y 12:00m (si la cita es en horas de la tarde), colocarse vía anal un enema Travad rectal.
 - El enema debe aplicarse de la siguiente forma: acuéstese del lado izquierdo e introduzca la cánula por el recto, deje pasar todo el líquido de la bolsa y se debe contenerlo sin dejarlo salir durante 5 minutos y después evacuarlo.
 - Inmediatamente después del enema, aplicar óvulo de Isodine
 - Desayunar liviano (agua panela con galletas de soda, no gaseosas, no lácteos).
 - Tomar la Ciprofloxacina tableta de 500mg a las 7 am y 7 pm; continuar cada 12 horas hasta completar 14 tabletas.

- Debe suspenderse los siguientes medicamentos si los usa: aspirina, Asawin, aspirineta, ibuprofeno, Diclofenaco o anticoagulantes, por ejemplo Warfarina o coumadin 10 días antes del examen; esta suspensión debe ser guiada y manejada por su médico tratante.
- Debe suspender todos los medicamentos homeopáticos como Ginkgo biloba, ácidos grasos, omega 3, vitamina E o Té verde.
- Si está tomando medicamentos de control para hipertensión arterial, epilepsia, diabetes u otras enfermedades que no requieren anticoagulación se deben seguir tomando con agua incluso el día del examen.
- Debe traer la historia clínica o los resultados de exámenes que le hayan realizado anteriormente y que tengan relación con el procedimiento.
- Debe asistir al examen con adulto responsable y sin discapacidades.
- Llevar los resultados de los siguientes exámenes de laboratorio:
 - T.P, TPT, Hemograma, Urocultivo y Antígeno Prostático que hayan sido realizados en menos de un mes.
- Si es un paciente anticoagulado de llevar resultado de INR que hayan sido realizados en menos de quince días (15).
- Debe usar ropa cómoda para la realización del estudio
- Debe presentarse 20 minutos antes de la cita para realizar todo el proceso de admisiones y verificación de la preparación.

Recomendaciones Durante el Estudio


- El procedimiento dura aproximadamente 30 minutos.
- Permanecer en recuperación por un tiempo no mayor a 1 hora
- Debe permanecer quieto mientras se lleva a cabo la biopsia.

Recomendaciones Posteriores al Estudio

- Guardar reposo estricto el día del estudio.
- Vigilar sangrado. **En caso de Sangrado Abundante, Fiebre y/o escalofríos, DEBE acudir de inmediato a URGENCIAS.**
- Continuar con la toma de ciprofloxacina tableta de 500mg a las 7 am y 7 pm; continuar cada 12 horas hasta completar 14 tabletas.

Recuerde:

Al tener en cuenta estas recomendaciones, contribuirá con un correcto diagnóstico.



MIGUEL PARRADO AVENDAÑO
UROLOGO
R.M. 50398